# Gel cicatrisant antibactérien

Description du produit

Melectis® contient des miels mono-floraux sélectionnés selon des critères antimicrobiens et cicatrisants. Il a été stérilisé aux rayons gamma afin d'assurer sa stérilité, tout en préservant ses propriétés biologiques.

Avantages de ce produit pour le traitement des plaies :

- Il procure une barrière protectrice antibactérienne, qui permet à la fois de prévenir et de réduire la colonisation bactérienne.
- Il est efficace contre un large spectre de bactéries Gram + et Gram -, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques (tels que les S.A.R.M, les E.R.V.).
- Il élimine les mauvaises odeurs.
- Associé à un pansement occlusif, il génère un environnement humide, pr opice à la réparation tissulaire.
- Il apporte des nutriments favorables à la prolifération des cellules du derme et de l'épiderme.
- Il n'adhère pas à la plaie et favorise le remplacement atraumatique des pansements.

Indications

Melectis® est destiné au traitement :

- Des plaies opératoires désunies (cicatrisation dirigée)
- Des plaies aigues et chroniques
- Des plaies cancérologiques
- Des brûlures du 1er et 2nd degrés
- Des ulcères et les escarres en phase de bourgeonnement

Contre-indications

- Melectis® ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une hypersensibilité au miel.
- Ne pas utiliser un tube endommagé, un risque de contamination de celui-ci étant encouru.
- Ne pas utiliser le produit après sa date de péremption. La date de péremption du produit se trouve sur l'étui cartonné ainsi que sur la soudure du tube sous la forme MM/AAAA. L'utilisation du produit après sa date de péremption entraîne un risque de contamination biologique du produit.

Mode d'emploi

Melectis® peut s'appliquer en fin de détersion sur une plaie contenant jusqu'à 20% de fibrine, pour relancer le processus de bourgeonnement.

1. Rincer la plaie avec du sérum physiologique. Sécher doucement le bord de la plaie. NB : cette étape est indispensable pour assurer une bonne cicatrisation.
2. Recouvrir l'intégralité de la surface de la plaie ou le pansement secondaire (un tulle gras, de préférence) d'une fine pellicule de Melectis®. Il est inutile de remplir les plaies cavitaires.
3. Recouvrir de compresses et d'un pansement occlusif durant les premières applications pour les plaies très exsudatives.

Remarques :

- En phase de détersion, et en fonction de l'état de la plaie, il est conseillé de refaire le pansement est refait une à deux fois par jour.
- En phase de bourgeonnement, il est conseillé de refaire le pansement toutes les 48 heures.

La fréquence de renouvellement du pansement doit être adaptée à chaque plaie par l'équipe médicale en charge du patient.

- Dans certains cas (moins de 5% des patients), l'application sur la plaie peut provoquer une irritation, une sensation de picotement ou de brûlure. Ces sensations peuvent être temporaires ou permanentes. Si un tel cas se produit, il est conseillé de renouveler le pansement en utilisant une compresse humide. En cas de persistance des symptômes, une autre solution de traitement devra être envisagée.

Conservation

- Conserver le produit avec sa notice d'utilisation à température ambiante.
- Un tube désoperculé peut être utilisé pendant 30 jours. Il est conseillé de noter la date d'ouverture sur le tube. La non contamination bactérienne du produit ne peut être assurée au-delà de ces 30 jours.

Conservez précieusement cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Pour plus de renseignements sur le produit, son utilisation, son efficacité, son mode d'action… vous pouvez visiter le site internet de la société : www.melectis.com